

## Skifflingar,

iakttagna i Mustiala trakten den 3 November 1878.

AF

P. A. KARSTEN.

(Anmaldt den 7 December 1878.)

Amanita	porphyria Fr.		
Lepiota	rhacodes (Vitt.).	Förvissnad.	
—	cinnabarina Fr.		
—	carcharias (Pers.).	Frisk.	
—	amianthina (Scop.).	Luxurierande.	
Armillaria	mellea (Vahl).		
—	var. bulbosa.	På lös jord, fullkomligt utbildad.	
Cortinellus	imbricatus (Fr.).	Dito	dito.
—	vaccinus (Pers.).	Dito	dito.
Tricholoma	equestre (Linn.).	Luxurierande.	
—	portentosum Fr.	Aftynande.	
—	rutilans (Schaeff.).	Frisk och frodig.	
—	saponaceum Fr.	Vissnad.	
—	subsp. luridum (Schaeff.).	Vissnad.	
—	virgatum Fr.	Frisk.	
—	inamoenum Fr.	Frisk, luxurierande.	
—	cerinum (Pers.).	Frisk.	
—	subsp. obscuratum Karst. *).	Luxurierande.	

\*) Pileus convexo-planus, repandus, alutaceo- vel fusco-rufus, 3—9 cm. latus. Stipes fibroso-striatus, fuscescente griseus, 2,5—6 cm. altus, 2—15 mm. crassus. — In Syrjööas sub umbra Abietis sat frequens.

Tricholoma	linctum Karst. *)	Frisk.
---	ulmarium (Bull.) Karst.	Lifligt vegeterande.
---	Schumacheri Fr.	Luxurierande.
---	oreinum Fr.	Förvissnad.
---	leucocephalum Fr.	
---	personatum Fr.	Frisk.
---	sordidum Fr.	Frisk.
Clitocybe	clavipes (Pers.).	Förvissnad.
---	hirneola Fr.	Lifligt vegeterande.
---	cerussata Fr.	Luxurierande.
---	phyllophila Fr.	Vissnad.
---	eandicans Fr.	Förvissnad.
---	gilva (Pers.).	Frisk.
---	cyathiformis (Bull.).	Luxurierande.
---	vibecina Fr.	Frisk.
---	orbiformis Fr.	Frisk.
---	metachrous Fr.	Frisk.
---	diatreta Fr.	Frodig.
Collybia	semitalis Fr.	
---	maculata (Alb. et Schw.).	Frisk.
---	butyracea (Bull.).	Aftynande.
---	var. leucophylla (Pers.).	Frisk.
---	velutipes (Curt.).	Lifligt vegeterande.
---	confluens (Pers.).	Förvissnad.
---	conigena (Pers.).	Fullt utvecklad.
---	esculenta (Wulf.).	Väl utbildad.
---	coracina Fr.	Lifligt vegeterande.
---	misera Fr.	Fullt utbildad.

---

\*) A *Tricholomate boreali*, pro quo antea habuimus quocumque statura et colore convenit, pileo haud rivuloso odoreque nullo recedit; quoque cum *Trich. civili* multum commune habet, sed pileo epelliculoso lamellisque haud decolorantibus mox dignotum.

Collybia	cessans Karst. I mängd framträdande.
Mycena	rosella Fr. Frisk.
---	pura (Pers.). Exolet.
---	lactea (Pers.). Lifligt vegeterande.
---	pithya Fr. Frisk.
---	rugosa Fr. Frisk.
---	galericulata (Scop.). Luxurierande.
---	filopes (Bull.). Frisk.
---	debilis Fr. Frisk.
---	cruenta Fr. Lifligt vegeterande.
---	epipterygia (Scop.). Frisk.
---	stylobates (Pers.).
Omphalia	maura Fr. Frisk.
---	incomis Karst. Frisk.
---	umbellifera (Linn.).
---	var. grisella Weinm. Frisk.
---	stellata Fr. Outbildad.
---	campanella (Batsch.). Frisk.
---	grisea Fr. Frisk och frodig.
---	vulgaris (Pers.). Frisk.
---	pyxidata (Bull.). Aftynande.
---	deflexa Karst. *). I rask tillväxt stadd.
---	fibula (Bull.) Frisk..
Pleurotus	serotinus (Schrad.). Lifligt vegeterande.
---	mitis (Pers.). Lifligt vegeterande.
---	nidulans (Pers.). I bästa växtkraft.
---	septicus Fr. Ymnigt framträdande.
Marasmius	putillus Fr. Frisk.

\*) *Omphaliae reclini proxima*, sed pileo haud expanso, haud vel minute umbilicato, margine haud reflexo, colore obscuriori stipiteqve pallido differens. Sporae ellipsoideo-sphaeroideae vel sphaeroideae, longit. 6—7 mmm., crassit. 4—6 mmm.

- Marasmius androsaceus (Linn.). Frisk.  
 ——— perforans Fr. Frisk.  
 Panus stipticus (Bull.). I frisk växtkraft.  
 Lentinus cochleatus (Pers.). Lifligt vegeterande.  
 Trogia crispa (Pers.).  
 Cantharellus cibarius Fr. Frisk.  
 ——— aurantiacus (Wulf.). Frisk.  
 ——— umbonatus Fr. Frisk.  
 Hygrophorus hypothejus Fr. Frisk.  
 ——— agathosmus Fr. Frisk.  
 ——— lividoalbus Fr. Frisk.  
 ——— pratensis (Pers.). Frisk.  
 ——— var. virgineus Fr. Frisk och frodig.  
 ——— ceraceus (Wulf.). Lifligt vegeterande.  
 ——— coccineus (Schaeff.). Lifligt vegeterande.  
 ——— miniatus Fr. Frisk.  
 ——— psittacinus (Schaeff.). Lifligt vegeterande.  
 ——— laccatus (Scop.). Frisk.  
 Lactarius vellereus Fr. Frisk.  
 ——— torminosus (Schaeff.). Halfrutten.  
 ——— turpis (Weinm.). Frisk.  
 ——— deliciosus (Linn.). Rutten.  
 ——— vietus Fr.  
 ——— rufus (Scop.). Förvissnad.  
 ——— lilacinus (Lasch.). Förvissnad.  
 ——— glyeiosmus Fr. Frisk.  
 Russula adusta (Pers.). Frisk.  
 ——— integra (Linn.). Aftynaude.  
 ——— rubra (DeC.). Aftynaude.  
 Entoloma majale Fr. Yppigt vegeterande.  
 Clitopilus prunulus (Scop.). Förvissnad.  
 Nolanea mammosa (Linn.). Vissnad.

- Claudopus variabilis* (Pers.). Lifligt vegeterande.  
*Pholiota togularis* (Bull.). Lifligt vegeterande.  
 ——— *mutabilis* (Schaeff.). Fullt utvecklad.  
 ——— *marginata* (Batsch.). Luxurierande.  
*Inocybe fibrosa* (Sow.).  
 ——— *geophylla* (Sow.). Frisk.  
 ——— var. *lilacina*. Frisk.  
 ——— *vatricosa* Fr. Lifligt vegeterande.  
*Hebeloma punctatum* Fr.  
 ——— *crustuliniforme* (Bull.). Skämd.  
*Flammula lenta* (Pers.). Luxurierande.  
 ——— *carbonaria* Fr. Frisk.  
 ——— *penetrans* Fr. Förvissnad.  
 ——— *hybrida* Fr.  
*Naucoria camerina* Fr. Frisk.  
 ——— *furfuracea* (Pers.). Frisk.  
 ——— *escharoides* Fr. Aftynande.  
*Galera tenera* (Schaeff. \*). Frisk.  
 ——— *Hypnorum* (Batsch.). Frisk.  
*Stropharia aeruginosa* (Curt.). Vissnad.  
 ——— *semiglobata* (Batsch.). Frisk.  
*Nematoloma* \*\*) *capnoides* (Fr.). Lifligt vegeterande.  
 ——— *elaeodes* (Fr.). Frisk.  
 ——— *fasciculare* (Huds.).  
*Hypholoma appendiculatum* (Bull.). Frisk.  
*Psilocybe atrorufa* (Schaeff.). Skämd.

\*) Enligt Gill. »Les Champignons qui croissent en France» är *Galera* generis masculini, *Tricholoma* o. *Hypholoma* gen. neutrius, men *Entoloma* o. *Hebeloma* gen. masculini, *Clitocybe* gen. feminini, men *Inocybe* et *Psilocybe* gen. masculini.

\*\*) *Nematoloma* gen. nov. Ab *Hypholomate* pileo tenaci, haud hygrophano, laete colorato diversum.

- Psilocybe* *spadicea* Fr. Rutten.  
 ——— *dichroa* (Pers.) var.  
*Psathyra* *pennata* Fr.  
*Panacolus* *separatus* (Linn.). Frisk.  
 ——— *campanulatus* (Linn.). Frisk.  
*Psathyrella* *caudata* Fr. Frisk.  
*Coprinus* *tardus* Karst. \*)  
 ——— *atramentarius* (Bull.). Rutten.  
 ——— *ephemeroides* (Bull.).  
*Cortinarius* *triumphans* Fr. Frisk.  
 ——— *balteatus* Fr. Frisk.  
 ——— *gentilis* Fr. Aftynande.  
 ——— *cinnamomeus* (Linn.). Aftynande.  
 ——— *armeniacus* (Schaeff.). Aftynande.  
 ——— *rigens* Fr. Frisk.  
 ——— *obtusus* Fr. Frisk.  
 ——— *acutus* (Pers.). Frisk.  
*Schizophyllum commune* (Linn.).

---

\*) *Caespitosus*. Pileus ex ovoideo expansus, glaber, luridus, sulcatus, 3—5 cm. latus. Stipes fistulosus, e sericello-pruinoso glabratus, striatulus, albus, 5—10 cm. longus, basi usque ad 0,5 cm. crassus. Lamellae adnatae, ex albido nigrae. Sporae ovoideae vel subangulato-ellipsoideae, atrae (sub lente), longit. 12—15 mmm., crassit. 7—9 mmm. — In horto Mustialensi supra terram nudam legit Onni Karsten.

Mustiala den 10 November 1878.

